

Tescil Edildiği Yıl: 2018

Çeşit Sahibi Kuruluş: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / KONYA

Morfolojik Özellikleri: Kılçıklı, başak orta boyda ve hafif renkli, tane amber renginde ve orta boylu bir çeşittir.

Tarımsal Özellikleri: Kışlık gelişme tabiatında, sağlam saplı ve kurak şartlara dayanıklı, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta, yüksek verimli bir çeşittir.

Verim Özellikleri: Kuru koşullarda ortalama 445 kg/da'dır.

Teknolojik Özellikleri: 1000 tane ağırlığı 33.8-48.9 g, protein oranı %13.2-17.9, hektolitreye ağırlığı 72.6-77.0 kg/hl, camsılık %92-98, SDS sedimentasyon 17-21 ml, ırmık b sarılık değeri 23.5-26.0, ırmık verimi %57.3-66.3 arasında değişmektedir.

Hastalık Durumu: Doğal epidemi koşullarında yaprak hastalıklarına dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler: İç Anadolu ve Geçit Bölgeleri ve benzer ekolojide yer alan bölgelerin kuru alanlarına tavsiye edilir.

"Kuru Şartlarda Buğdayın İncisi, Verimin Birincisi"

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler

Tohumluk miktarı: 18-20 kg/da sertifikalı tohum

Ekim zamanı : 1-15 Ekim

Ekim derinliği : 4-5 cm

Gübreleme : Toprak analizine göre kullanılmalıdır.



ADRES: Apak Mh. Konya Cd. No: 38-38 A KARAPINAR / KONYA
TEL.: +90 332 755 35 52 - FAKS: +90 332 755 21 21
E-POSTA: info@zengintarim.com.tr - WEB: www.zengintarim.com.tr

**Toprağa
Bereket Ekliyoruz**

GRAFİK



Tescil Edildiği Yıl: 2018

Çeşit Sahibi Kuruluş: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / KONYA

Morfolojik Özellikleri: 2 sıralı, kılçıklı, uzun başaklı, beyaz taneli ve orta uzun boylu bir çeşittir.

Tarımsal Özellikleri: Alternatif gelişme tabiatında, sağlam saplı, yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi çok yüksek, eş zamanlı olgunlaşma özelliğine sahip, olgunlaşma zamanı orta, başakta kırılma özelliği olmayan, harmanlanma özelliği iyi, suya ve azota tepkisi iyi, yüksek verimli bir çeşittir.

Verim Özellikleri: Kuru koşullarda 350-650 kg/da'dır. Destek sulu şartlarda 900 kg/da'a kadar çıkabilmektedir.

Teknolojik Özellikleri: 1000 tane ağırlığı 42-47 gr, protein oranı %12.5-16.5, hektolitre ağırlığı 62-70 kg/hl arasında değişmektedir.

Hastalık Durumu: Arpa çizgili yaprak lekesine orta hassas, Arpa yaprak lekeli ve küllemeye dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler: Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzer ekolojije sahip bölgelerin kuru ve destek sulama yapılabilen alanlarına tavsiye edilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler

Tohumluk miktarı: 18-22 kg/da sertifikalı tohum

Ekim zamanı : 1-15 Ekim

Ekim derinliği : 4-5 cm

Gübreleme : Toprak analizine göre kullanılmalıdır.



"Her Şartta Yüksek Verim"



ADRES: Apak Mh. Konya Cd. No: 38-38 A KARAPINAR / KONYA
TEL.: +90 332 755 35 52 - FAKS: +90 332 755 21 21
E-POSTA: info@zengintarim.com.tr - WEB: www.zengintarim.com.tr

**Toprağa
Bereket Ekiliyor**

GRAFİK



Tescil Edildiği Yıl: 2018

Çeşit Sahibi Kuruluş: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / KONYA

Morfolojik Özellikleri: Kılıçkılı, başak orta boyda ve kırmızı renkli, kırmızı taneli ve uzun/çok uzun boylu bir çeşittir.

Tarımsal Özellikleri: Alternatif gelişme tabiatında, sağlam saplı ve kurak şartlara dayanıklı, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta, yüksek verimli ve ekmeklik kalitesi oldukça iyi olan bir çeşittir.

Verim Özellikleri: Kuru koşullarda ortalama 378 kg/da'dır.

Teknolojik Özellikleri: 1000 tane ağırlığı 27.1-38.0 g, protein oranı %13.5-18.2, hektolitre ağırlığı 70.9-80.5 kg/hl, zeleni sedimentasyon 36-70 ml, alveograf enerji değeri 273, su absorpsiyonu %59.7-64.7 arasında değişmektedir.

Hastalık Durumu: Doğal epidemik koşullarında yaprak hastalıklarına dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler: İç Anadolu ve Geçit Bölgeleri ve benzer ekolojide yer alan bölgelerin kuru ve taban alanlarına tavsiye edilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler

Tohumluk miktarı : 18-20 kg/da sertifikalı tohum

Ekim zamanı : 1-15 Ekim

Ekim derinliği : 4-5 cm

Gübreleme : Toprak analizine göre kullanılmalıdır.



"Kuru Şartların Yüksek Kaliteli Buğdayı"



ADRES: Apak Mh. Konya Cd. No: 38-38 A KARAPINAR / KONYA
TEL.: +90 332 755 35 52 - FAKS: +90 332 755 21 21
E-POSTA: info@zengintarim.com.tr - WEB: www.zengintarim.com.tr

*Toprağa
Bereket Ekliyoruz*

GRAFİK



RİCH AMİNO

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA ŞEKLİ TOPRAKTAN (ml/da)	UYGULAMA ŞEKLİ YAPRAKTAN (ml/da)
Domates, Biber, Salatalık, Kabak, Patlıcan, Çilek vb.	Dikimden sonra toprağa verilir 15 gün ara ile devam edilir	1500	100 - 150
Turuncgiller	Çiçek öncesi ve çiçeklenmeden 20 gün sonra	1250	100 - 150
Kiraz, Erik, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut vb.	Çiçek öncesi ve çiçeklenmeden 20 gün sonra	1000	100 - 150
Muz	Mart ayından itibaren 15 - 20 gün ara ile	1500	150
Kesme Çiçekçilik	Dikimden itibaren 15 -20 gün ara ile	1500	150
Mısır, Pamuk	İlk sürgünlemeden itibaren	1000	100
Asma	Çiçeklenme öncesi ve sonrası 2 defa	1500	100 - 150
Tahıllar	Ekimden önce veya sonra verilen ilaçlarla beraber	1000	100
Fide yetiştiriciliği	Fidelerin sulama suyuna ilave edilir	-	100



RİCH AMİNO NE İŞE YARAR ?

Amino Asitler, bitki gelişimi ve dengeli beslenme için önemli bir protein kaynağıdır. Bitki köklerinin kuvvetlenmesini ve hızlı köklenmeyi sağlar.

Bitki direncini hava koşullarına göre artırır. Bitkilerdeki başlıca görevleri, büyümeyi teşvik etmesi, meyve kalitesini artırması ve meyve olgunlaşmasını sağlamasıdır.

RİCH AMİNO Yüksek oranda organik madde (humik+fulvik asit) ile birlikte azot içeren bitkisel menşeli amino asit çözeltisidir.

Bitkilerin hızlı, sağlıklı ve gür gelişmesini sağlar. Çiçeklenmenin düzgün, meyve sayısı ve kalitesinin yüksek olmasını teşvik eder. Hasat süresini kısaltır, üründe erkencilik sağlar.

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



RİCH FEED

7-7-40+ME

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN UYGULAMA Damlama Sulama ile	YAPRAKTAN UYGULAMA
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar Patlıcan, Fasulye, Çilek vb)	Gelişme dönemi boyunca 15-20 gün aralıklarla	1 kg / Da	100 Litre Suyu 200-250 gr
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER (Maydanoz, Marul, Lahana, Ispanak vb)	3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla	1 kg / Da	100 Litre Suyu 200-250 gr
YUMRULU BİTKİLER (Patates, Soğan, Havuç v.b) Kavun, Karpuz, Kabak	4-6 yapraklı dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla	1 kg / Da	100 Litre Suyu 200-250 gr
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik Elma, Armut, Ayva, Turuncgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb)	Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrerrürde uygulanır.	2 kg / Da	100 Litre Suyu 200-250 gr
ENDÜSTİRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Tütün, Ayçiçeği, Şekerpancarı, Mısır, Soya, Yonca, Haşhaş, Yerfıstığı vb)	5-6 yapraklı dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla	1 kg / Da	100 Litre Suyu 200-250 gr
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye Mercimek, vb)	5-6 yapraklı dönemde ve 15-20 gün sonra	1 kg / Da	100 Litre Suyu 200-250 gr
TAHILLAR (Buğday, Arpa, Çeltik vb)	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde	-----	100 Litre Suyu 200-250 gr
Yeşil Alanlar	Gelişme dönemi boyunca	-----	100 Litre Suyu 200-250 gr



RİCH FEED 7-7-40+ME NE İŞE YARAR ?

RİCH FEED 7-7-40 +ME suda tamamen ve hızlı çözünür, yüksek kalitede NPK ve , şelatlı mikro elementler beraberinde, içerdiği özel katkı maddeleri nedeniyle, bitki beslemede daha etkili ve kolay alınabilirlik gibi kendine özgü faydaları vardır.

RİCH FEED 7-7-40 +ME soğuk, ıslak, alkali şartlarda bitkilerin ek besin ihtiyaçlarını geliştirilmiş formülasyonları ile karşılar. İyi bir başlangıç, gelişim, erken ve kaliteli ürün elde etmek için tasarlanan bir gübredir. Verim ve kaliteyi artırır. Kolay kullanımı ile zaman kazandırır, maliyeti düşürür. RİCH FEED 7-7-40+ME kristal yapıda bir gübredir ve içeriğindeki inorganik asitler sayesinde kuvvetli asidik özelliklere sahiptir. RİCH FEED 7-7-40 +ME özellikleri sayesinde sulama sistemlerini temiz tutar, tıkanmayı önler, su ve gübrenin eşit dağılmasını sağlar.

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



ABDULLAH ZENGİN TARIM ÜRÜNLERİ MÜH. VE NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES: Apak Mh. Konya Cd. No: 38-38 A KARAPINAR / KONYA
TEL: +90 332 755 35 52 - FAKS: +90 332 755 21 21
E-POSTA: info@zengintarim.com.tr - WEB: www.zengintarim.com.tr

RİCH FEED

12-40-12+ME

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN UYGULAMA Damlama Sulama ile	YAPRAKTAN UYGULAMA
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar Patlıcan, Fasulye, Çilek vb)	Gelişme dönemi boyunca 15-20 gün aralıklarla	1 kg / Da	100 Litre Suyu 200-250 gr
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER (Maydanoz, Marul, Lahana, Ispanak vb)	3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla	1 kg / Da	100 Litre Suyu 200-250 gr
YUMRULU BİTKİLER (Patates, Soğan, Havuç v.b) Kavun, Karpuz, Kabak	4-6 yapraklı dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla	1 kg / Da	100 Litre Suyu 200-250 gr
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik Elma, Armut, Ayva, Turuncgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb)	Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrerrürde uygulanır.	2 kg / Da	100 Litre Suyu 200-250 gr
ENDÜSTİRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Tütün, Ayçiçeği, Şekerpancarı, Mısır, Soya, Yonca, Haşhaş, Yerfıstığı vb)	5-6 yapraklı dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla	1 kg / Da	100 Litre Suyu 200-250 gr
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye Mercimek, vb)	5-6 yapraklı dönemde ve 15-20 gün sonra	1 kg / Da	100 Litre Suyu 200-250 gr
TAHILLAR (Buğday, Arpa, Çeltik vb)	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde	-----	100 Litre Suyu 200-250 gr
Yeşil Alanlar	Gelişme dönemi boyunca	-----	100 Litre Suyu 200-250 gr



RİCH FEED 12-40-12+ME NE İŞE YARAR ?

RİCH FEED 12-40-12+ME suda tamamen ve hızlı çözünür, yüksek kalitede NPK ve şelatlı mikro elementler beraberinde, içerdiği özel katkı maddeleri nedeniyle, bitki beslemede daha etkili ve kolay alınabilirlik gibi kendine özgü faydaları vardır. RİCH FEED 12-40-12 +ME soğuk, ıslak, alkali şartlarda bitkilerin ek besin ihtiyaçlarını, geliştirilmiş formülasyonları ile karşılar. İyi bir başlangıç, gelişim, erken ve kaliteli ürün elde etmek için tasarlanan bir gübredir. Verim ve kaliteyi artırır. Kolay kullanımı ile zaman kazandırır, maliyeti düşürür. RİCH FEED 12-40-12 +ME kristal yapıda bir gübredir ve içeriğindeki inorganik asitler sayesinde kuvvetli asidik özelliklere sahiptir. RİCH FEED 12-40-12 +ME özellikleri sayesinde sulama sistemlerini temiz tutar, tıkanmayı önler, su ve gübrenin eşit dağılmasını sağlar.

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



RİCH COMBİ-MİX

Bitkinin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. RİCH COMBİ MİX içeriğinde bulunan mikro elementler, bitkilerde çeşitli metabolizma faaliyetlerinde görev alır.

Yapraktan ve topraktan uygulama yapılabilir. Mikro element noksanlarının önlemek için geliştirilmiş, alkali ve kireçli topraklar için uygun, bor, bakır, demir, mangan ve çinko içeren mikro element karışımıdır.

Mikro element noksanlığı yaprakta, sararma, şekil bozukluğu, lekeler veya kuruma şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Noksanlıklar görülmeye başlandıktan sonra bitkinin büyümesi ve gelişmesi yavaşlar.

Noksanlığa en hassas ürünler süs ve tarla bitkileri, meyve ağaçları, sebzelerdir.



Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksi takdirde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



RİCH AMİNO

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	TOPRAKTAN UYGULAMA (lt/dönüm)	YAPRAKTAN UYGULAMA (cc/100 l suya)
Pamuk	İlk çıkıştan itibaren	1	100 - 150
Hububat	İlk çıkıştan itibaren	1	150 - 200
Kayısı, Şeftali, Antep Fıstığı	Çiçeklenmeden hemen sonra	1	150 - 200
Bağ	İlk yaprak oluşumundan sonra	1	100 - 150
Yer Fıstığı, Mısır	İlk çıkıştan itibaren	1	100 - 150
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Lahana, Muz, Brokoli, Karnabahar, Fasulye, Kolza, Kavun, Karpuz, Şeker Pancarı	İhtiyaç duyulduğu her dönemde	1	100 - 150
Narenciye	Çiçeklenme öncesi ve sonrası	1	150 - 200
Kivi	İhtiyaç duyulduğu her dönemde	1	150 - 200
Kesme Çiçekçilik, Meyve Fidanları	İhtiyaç duyulduğu her dönemde	1	75 - 100



RİCH BOR NE İŞE YARAR ?

RİCH BOR yüksek oranda bor içeren bir gübredir. Bor hücre duvarının yapısına girerek duvarın direncini artırır. Meristematik doku gelişmesi için gerekli olduğundan, tohumda çimlenme ve bitkide çiçeklenme gibi olaylarda rol alır.

Bitkide karbonhidrat taşınma mekanizmasını kontrol eder. Protein sentezinde önemli rol oynar. Bitki içerisindeki hareketi, bitkinin kesilen borusunda suyun hareketi ile olur. Bu nedenle stomaların kapalı olduğu transpirasyon olmadığı devreler de bor taşınmaz .

RİCH BOR yapısındaki özellik sebebiyle kolayca alınır ve taşınır. Bor noksanlığı büyüme noktalarındaki aşırı büyüme yavaşlaması ile kendi gösterir. Genç yaprakların biçimleri bozulur, yüzeylerindeki kabanklıklar ve çürüklükler oluşur.

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

